

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komplikasi Kehamilan

1. Usia (resiko tinggi kehamilan dengan < 19 dan lebih 35)
2. Type of recydence (resiko tinggi pada ibu hamil yang berada di pedesaan)
3. Pendidikan (Pendidikan rendah dengan ibu yang tidak pernah mendapatkan pendidikan sama sekali beresiko lebih tinggi)
4. Indeks kekayaan (indeks pendapatan rendah lebih beresiko tinggi terhadap terjadinya komplikasi kehamilan)
5. Kunjungan rumah sakit (ibu hamil yang tidak pernah melakukan kunjungan rumah sakit beresiko komplikasi kehamilan karena ideal dalam kehamilan 8 kali kunjungan rumah sakit)
6. Jumlah anak hidup (jumlah anak hidup ≤ 2 lebih beresiko mangalami komplikasi kehamilan)
7. Asuransi Kesehatan (ibu hamil yang tidak memiliki asuransi Kesehatan lebih beresiko mengalami komplikasi kehamilan di karenakan kendala biaya yang sehubungan dengan indeks kekayaan)
8. Provinsi

8. Gaya hidup
9. Kesehatan mental


Komplikasi kehamilan

Tanda dan gejala komplikasi kehamilan


1. Pendarahan pervaginam
2. Nyeri pada kepala
3. Pandangan kabur
4. Nyeri pada abdomen
5. Bengkak pada daerah muka dan tangan
6. Tidak ada gerakan janin
7. Keluar cairan pervaginam dan ketuban pecah dini
8. Mual dan muntah
9. Hipertensi pada kehamilan

Keterangan :

 : Tidak diteliti

 : Diteliti

 : Berpengaruh

 Referensi : (Kuriasari, Yuviska, 2022).

Dampak dari komplikasi kehamilan :

1. Kesehatan fisik ibu dan kelainan pada janin
2. Stress dan kecemasan
3. Keterbasan aktivitas
4. Resiko kelahiran premature

3.2 Penjelasan Kerangka Konsep

Kehamilan merupakan keadaan fisiologis dimana seorang Wanita akan mengandung janin dengan kurun waktu 280 hari atau 40 minggu mulai dari fertilisasi hingga proses kelahiran bayi, kehamilan dengan resiko tinggi terjadinya komplikasi pada ibu hamil merupakan masalah yang sangat kompleks karena komplikasi kehamilan merupakan penyebab kematian langsung pada ibu hamil atau bersalin komplikasi kehamilan dapat muncul sejak sebelum kehamilan oleh karena itu di anjurkan oleh ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan untuk melihat perkembangan dan Kesehatan ibu dan janin. Tetapi banyak Wanita di Indonesia melaporkan kematian ibu hamil paling sering karena terjadinya komplikasi di karenakan kurang optimalnya KIE di Indonesia. Kurangnya KIE di indoensia di pengaruhi oleh faktor demografid dan Kesehatan seperti Usia, Provinsi, Type of residence, Pendidikan, Indeks kekayaan, Kunjungan rumah sakit, Bahaya Kehamilan, Jumlah Kehamilan, Jumlah anak hidup, Asuransi Kesehatan. Komplikasi Di Indonesia banyak kasus kematian pada ibu hamil di karenakan komplikasi kehamilan karena kurangnya pengetahuan atau terpaparnya informasi terkait tanda dan gejala komplikasi kehamilan seperti Pendarahan pervaginam Nyeri pada kepala, Pandangan kabur, Nyeri pada abdomen, Bengkak pada daerah muka dan tangan, Tidak ada gerakan janin, Keluar cairan pervaginam dan ketuban pecah dini Mual dan muntah , Hipertensi pada kehamilan.

3.3 Hipotesis Penelitian

H0: Tidak ada Pengaruh yang signifikan antara variabel independent dengan Komplikasi Kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor Usia dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor provinsi dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor Domisili Tempat Tinggal dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor Pendidikan Tempat Tinggal dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor Status Ekonomi dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor Kunjungan Antenatal Care dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor Pengetahuan Bahaya Kehamilan dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor Jumlah Kehamilan dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor Jumlah anak Hidup dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

H1: Ada Pengaruh yang signifikan antara Faktor Asuransi Kesehatan dengan komplikasi kehamilan di Indonesia : *a cross-sectional analysis of demographic and health survey.*

