



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Turnitin Instructor
Assignment title: Dyah Rahmasari
Submission title: FORMULASI MASKER PEEL-OFF EKSTRAK DAUN KEMANGI (Oc...
File name: 5.pdf
File size: 476.48K
Page count: 8
Word count: 3,162
Character count: 19,488
Submission date: 05-Oct-2023 11:18AM (UTC+0700)
Submission ID: 2186164642

Medical Sains
Vol. 6 No. 1, September 2021
ISSN : 2541-2027; e-ISSN : 2548-2114

FORMULASI MASKER PEEL-OFF EKSTRAK DAUN KEMANGI (*Ocimum sanctum*) SEBAGAI SEDIAAN ANTI JERAWAT

FORMULATION OF PEEL-OFF MASK BASIL (*Ocimum sanctum*) LEAVES EXTRACT AS AN ANTI-ACNE PREPARATION

Alifia Ramadanti¹, Dyah Rahmasari^{1*}, Windi Moulana¹, Deep Erika Rahayu¹,
M. Imam Assidqi¹, Raditya Weka Nugraheni¹
¹Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang
Email : dyahrahmasari@umm.ac.id

Submitted : 11 July 2021 | Reviewed : 2 September 2021 | Accepted : 22 September 2021

ABSTRAK

Jerawat merupakan gangguan pada folikel pilosubseba yang banyak ditemukan pada remaja. Spesies mikroba yang terlibat dalam patogenesis jerawat adalah *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, dan *Staphylococcus epidermidis*. Daun kemangi (*Ocimum sanctum*) merupakan salah satu tanaman yang memiliki aktivitas antibakteri dan dapat diformulasikan dalam sediannya masker *peel-off*. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi masker *peel-off* yang dibuat dari ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum*) yang memiliki aktivitas antibakteri. Ekstrak daun kemangi diperoleh dengan cara menyerapnya pada pelarut etanol 96%. Kemudian dilakukan diluaran menjadi masker *peel-off* dengan variasi konsentrasi 6%, 8%, 10%. Dilakukan pengujian terhadap sifat fisikokimia seperti organoleptis, homogenitas, nilai pH, viskositas, daya sebar, dan waktu pengeringan, sedangkan uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi langsung. Diameter zona hambat pada uji antibakteri terbesar adalah pada konsentrasi ekstrak 10% dengan diameter zona hambat $23,13\text{mm} \pm 1,82$ mm melawan *Propionibacterium acne*, $11,62\text{mm} \pm 0,27$ mm melawan *Staphylococcus aureus*, dan $21,21\text{mm} \pm 1,72$ terhadap *Staphylococcus epidermidis*. Dapat disimpulkan bahwa masker *peel off* ekstrak daun kemangi punya efek terhadap *Propionibacterium acne* yang termasuk dalam kategori efek antibakteri kuat.

Kata kunci : Ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum*), Masker *Peel-off*, Anti-jerawat, *Propionibacterium acne*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*

ABSTRACT

Acne is a pilosebaceous disorder which commonly found in teenagers. The species of microorganisms involved in acne, pathogenic bacteria *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, and *Staphylococcus epidermidis*. Basil (*Ocimum sanctum*) leaves is one of the plants which has antibacterial activity which could be formulated in a *peel-off* mask preparation. The aims of this research are to develop and evaluate a *peel-off* mask prepared from basil (*Ocimum sanctum*) leaves extract, which has antibacterial activity. Basil leaves extract was obtained by maceration using 96% of ethanol solvent. Then, the extract was formulated into *peel-off* mask with varying concentration of 6%, 8%, 10%. Physicochemical properties such as organoleptic, homogeneity, pH value, viscosity, spreading power, and drying time were tested, while antibacterial activity test was conducted by the well-diffusion method. The largest diameter of inhibition zone of antibacterial evaluation is at an extract concentration of 10% with a diameter of the inhibition zone are $23,13\text{mm} \pm 1,82$ against *Propionibacterium acne*, $11,62\text{mm} \pm 0,27$ against *Staphylococcus aureus*, and $21,21\text{mm} \pm$

Open Journal Systems STF Muhammadiyah Cirebon : ojs.stfmuhmuhammadiyahcirebon.ac.id

FORMULASI MASKER PEEL-OFF EKSTRAK DAUN KEMANGI (*Ocimum sanctum*) SEBAGAI SEDIAAN ANTI JERAWAT

by Turnitin Instructor

Submission date: 05-Oct-2023 11:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 2186164642

File name: 5.pdf (476.48K)

Word count: 3162

Character count: 19488

11
**FORMULASI MASKER PEEL-OFF EKSTRAK DAUN
KEMANGI (*Ocimum sanctum*) SEBAGAI SEDIAAN ANTI
JERAWAT**

**FORMULATION OF PEEL-OFF MASK BASIL (*Ocimum sanctum*)
LEAVES EXTRACT AS AN ANTI-ACNE PREPARATION**

Alifia Ramadanti¹, Dyah Rahmasari^{1*}, Winda Maulana¹, Desy Erika Rahayu¹,
M. Imam Asshidiq¹, Raditya Weka Nugraheni¹

¹Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang

Email : dyahrahmasari@umm.ac.id

Submitted : 11 Juli 2021 Reviewed : 2 September 2021 Accepted : 22 September 2021

ABSTRAK

Jerawat merupakan gangguan pada folikel pilosebasea yang banyak ditemukan pada remaja. Spesies mikroba yang terlibat dalam patogenesis jerawat adalah *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, dan *Staphylococcus epidermidis*. Daun kemangi (*Ocimum sanctum*) merupakan salah satu tanaman yang memiliki aktivitas antibakteri dan dapat diformulasikan dalam sediaan masker *peel-off*. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi masker *peel-off* yang dibuat dari ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum*) yang memiliki aktivitas antibakteri. Ekstrak daun kemangi diperoleh dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Ekstrak kemudian diformulasikan menjadi masker *peel-off* dengan variasi konsentrasi 6%, 8%, 10%. Dilakukan pengujian terhadap sifat fisikokimia seperti organoleptis, homogenitas, nilai pH, viskositas, daya sebar, dan waktu pengeringan, sedangkan uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi sumur. Diameter zona hambat pada uji antibakteri terbesar adalah pada konsentrasi ekstrak 10% dengan diameter zona hambat $23,13\text{mm} \pm 1,82$ terhadap *Propionibacterium acne*, $11,62\text{mm} \pm 0,27$ terhadap *Staphylococcus aureus*, dan $21,21\text{mm} \pm 1,72$ terhadap *Staphylococcus epidermidis*. Dapat disimpulkan bahwa masker *peel off* ekstrak daun kemangi paling efektif terhadap *Propionibacterium acne* yang termasuk dalam kategori efek antibakteri kuat.

Kata kunci : Ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum*), Masker *Peel-off*, Anti-jerawat, *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*

ABSTRACT

*Acne is a pilosebaceous disorder which commonly found in teenagers. The species of microbes that are involved in acne pathogenesis are *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, and *Staphylococcus epidermidis*. Basil (*Ocimum sanctum*) leaves is one of the plants which has antibacterial activity and could be formulated in a *peel-off* mask preparation. The aims of this research are to develop and evaluate a *peel-off* mask prepared from basil (*Ocimum sanctum*) leaves extract, which has antibacterial activity. Basil leaves extract was obtained by maceration using 96% of ethanol solvent. Then, the extract was formulated into *peel-off* mask with varying concentration of 6%, 8%, 10%. Physicochemical properties such as organoleptic, homogeneity, pH value, viscosity, spreadability, and drying time were tested, while antibacterial activity test was conducted by the well-diffusion method. The largest diameter of inhibition zone of antibacterial evaluation is at an extract concentration of 10% with a diameter of the inhibition zone are $23,13\text{mm} \pm 1,82$ against *Propionibacterium acne*, $11,62\text{mm} \pm 0,27$ against *Staphylococcus aureus*, and $21,21\text{mm} \pm 1,72$ against *Staphylococcus epidermidis*.*

1,72 against *Staphylococcus epidermidis*. It can be concluded that the peel-off mask of basil leaves extract is the most effective in *Propionibacterium acne* which categorized as powerful antibacterial effect.

Keywords: Basil (*Ocimum sanctum*) leaves extract, Peel-off mask, Anti-acne, *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*.

Penulis Korespondensi :

Alifia Ramadanti
Universitas Muhammadiyah Malang
Email : dyahrahmasari@umm.ac.id

PENDAHULUAN

Jerawat merupakan salah satu masalah infeksi kulit yang banyak terjadi pada remaja. Jerawat salah satu infeksi kulit berulang yang dapat menurunkan kepercayaan diri hingga menyebabkan stress. Seringkali jerawat dapat meninggalkan bekas luka permanen pada wajah (Sutanto, 2013). Ada empat proses yang berhubungan dengan timbulnya jerawat yaitu produksi sebum yang meningkat, peluruhan dari keratinosit, pertumbuhan bakteri dan peradangan. Organisme yang berperan dalam patogenesis jerawat adalah *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, dan *Staphylococcus epidermidis*. Pengobatan jerawat biasanya menggunakan antibiotik untuk mengurangi jumlah bakteri seperti eritromisin dan klindamisin. Namun, penggunaan antibiotik dalam jangka panjang dapat menimbulkan resistensi¹⁰ serta dapat merusak organ (Walsh et al, 2016).

Daun kemangi (*Ocimum sanctum*) merupakan salah satu tanaman yang memiliki aktivitas antibakteri dan dapat diformulasikan dalam sediaan masker *peel-off*. Beberapa golongan kandungan bahan aktif yang ada pada daun kemangi juga berpotensi sebagai bakteriostatik dan bakteriosida seperti senyawa minyak atsiri, fenol dan alkaloid. Ekstrak etanol daun kemangi (*Ocimum sanctum*) dapat digunakan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat yang hidup dan berkembang biak dengan mudah pada daerah kulit (Ali and Dixit, 2012). Umumnya untuk menjaga keseimbangan dan elastisitas kulit digunakan berbagai macam variasi kosmetik, salah satunya adalah masker *peel-off*. PVA dipilih sebagai basis pada sediaan masker *peel-off* yang berfungsi sebagai pembentuk lapisan film yang bersifat *biodegradable* dan *biocompatible* dimana dapat menghasilkan *peel-off* gel yang cepat kering dengan lapisan film yang transparan, kuat, plastis dan melekat baik pada kulit (Andini et al, 2017). PVA merupakan polimer *biodegradable* ramah lingkungan, yang mampu menghasilkan lapisan tipis yang baik pada kulit (Asthana et al., 2021). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arinjani dkk (2020), menunjukkan bahwa konsentrasi PVA sebagai *plasticizer* pada masker *peel-off* menunjukkan hasil karakteristik fisik yang baik meliputi pH, viskositas, daya lekat, daya sebar dan waktu mengering pada konsentrasi 10%.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Tambajong (2017), ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum* L.) memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus epidermidis* dalam konsentrasi 10% dengan rata – rata zona hambat adalah 9,2mm. Menurut Septianindri (2015) ekstrak etanol daun kemangi (*Ocimum sanctum*) dalam kadar 15% memiliki zona hambat 3,5mm terhadap bakteri *Propionibacterium acnes*. Sedangkan menurut Angelina (2015) zona hambat ekstrak etanol daun kemangi (*Ocimum sanctum*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan kadar 20% adalah²³ luas 12,10 mm. Berdasarkan temuan tersebut ingin dikembangkan ekstrak daun kemangi dalam bentuk sediaan *peel-off anti-acne* yang mudah digunakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisikokimia dan aktivitas antibakteri dari sediaan masker *peel-off* yang dikembangkan menggunakan ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum*).

25

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah *analytical balance* (Metler Toledo), pH meter (Schott), viskometer (Brookfield), autoklaf, bunsen, jarum ose, cawan petri (Pyrex), inkubator (Memmert), jangka sorong, mikropipet, *stopwatch* dan seperangkat alat gelas. [5]

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum L*) yang diperoleh dari Materia Medica Batu, Indonesia, polivinil alcohol (PVA), propilenglikol, propil paraben, metil paraben, etanol 96%, kristal violet, lugol, safranin, *nutrient agar*, *Clindamycin gel* dan aquadest, serta bakteri *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Propionibacterium acne*.

Pembuatan Masker Peel-Off Ekstrak Daun Kemangi

Masker *peel-off* ekstrak daun kemangi dibuat sesuai dengan formula pada Tabel I. Pembuatan masker diawali dengan menimbang semua bahan lalu dilanjutkan dengan mengembangkan PVA menggunakan aquadest sebanyak 3[16] kali bobot PVA dan dipanaskan hingga mengembang sempurna membentuk basis *peel-off*. Metil paraben dan propil paraben dilarutkan dalam propilenglikol. Setelah campuran PVA dingin, semua bahan dan sisa aquadest di[17]mpur dan ditambahkan ekstrak daun kemangi yang telah dilarutkan dengan etanol 96% sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen.

Tabel I. Formulasi Masker Peel-off Ekstrak Daun Kemangi

Bahan	Formula (%)		
	1	2	3
Ekstrak daun kemangi	6	8	10
PVA	10	10	10
Propilenglikol	15	15	15
Metil Paraben	0,2	0,2	0,2
Propil Paraben	0,1	0,1	0,1
Etanol 96%	15	15	15
Parfum	qs	qs	qs
Aquadest	ad 100	ad 100	ad 100

Evaluasi Karakteristik Fisikokimia Masker Peel-Off Ekstrak Daun Kemangi

Evaluasi yang dilakukan meliputi pengamatan organoleptis dan homogenitas, penentuan nilai pH, viskositas, daya sebar dan waktu mengering sediaan. Pemeriksaan organoleptis dilakukan dengan mengobservasi warna, bau dan tekstur dari sediaan secara visual (Al Muazham and [20]snani, 2017). Homogenitas diamati secara visual terhadap adanya butiran kasar pada sediaan. Penentuan nilai pH dilakukan menggunakan pH meter digital dan nilai viskositas menggunakan viskometer. Daya sebar ditentukan dengan meletakkan sejumlah sediaan diantara dua preparat kaca yang diberikan sejumlah beban (Saptarini and Hadisoebroto, 2020). Sedangkan waktu mengering dilakukan secara *in-vitro* menggunakan *stopwatch* dengan mengoleskan sediaan pada kaca objek dan dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 37°C (Rompis *et al*, 2019).

Pengujian Aktivitas Antibakteri

Sterilisasi Alat

[5] Media dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pengujian, disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Selanjutnya untuk jarum ose dan pinset dibakar diatas api bunsen langsung (Afni *et al*, 2015).

Preparasi Media

Dalam penelitian ini digunakan media yaitu *Nutrient Agar* (NA). Pembuatan media ini dilakukan dengan melarutkan bahan sebanyak 28gram kedalam 1 L aquadest pada

2

erlenmeyer dengan kapasitas 1 L. Erlenmeyer tersebut diletakkan diatas *hot plate* dan diaduk menggunakan *magnetic stirrer* untuk mempercepat pelarutan sampai didapatkan larutan media menjadi berwarna kuning jernih. Setelah itu erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil kemudian disterilisasi dengan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C. Dituang media steril ke cawan petri steril secara aseptis (Afni *et al*, 2015).

Pembuatan Standar Mc Farland

24

Standar Mc Farland dibuat dengan cara menambahkan aquadest ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan H_2SO_4 1% sebanyak 9950 μL dan $BaCl_2$ 1% sebanyak 50 μL dan kocok hingga homogen dan terbentuk larutan keruh (Standar McFarland 0,5). Kekeruhan ini dipakai sebagai acuan suspensi bakteri dengan tingkat kekeruhan 10^8 CFU/ml (Kindangen *et al*, 2018).

Pembuatan Suspensi Bakteri Uji

1

Bakteri uji dari hasil peremajaan agar miring diambil dengan kawat ose steril lalu diinokulasikan ke dalam tabung yang berisi 10 ml larutan NaCl 0,9% hingga diperoleh kekeruhan yang sama dengan standar kekeruhan larutan Mc. Farland. Perlakuan yang sama dilakukan pada setiap jenis bakteri uji.

Uji aktivitas antibakteri secara *In-vitro*

3

Uji aktivitas antibakteri secara *in-vitro* dilakukan dengan metode difusi sumuran. Sediaan masker *peel-off* ekstrak daun kemangi dengan variasi kadar yang berbeda (6%, 8% dan 10%) diletakkan pada lubang sumur yang berbeda sebanyak 100 μL . Selanjutnya, basis sediaan tanpa bahan aktif yang digunakan sebagai kontrol negatif, diteteskan pada lubang sumur sebanyak 100 μL . *Clindamycin* gel yang digunakan sebagai kontrol positif, diteteskan pada lubang sumur dan diteteskan sebanyak 100 μL . Kemudian cawan petri diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37°C selama 24 jam (Afni *et al*, 2015).

Pengamatan dan Pengukuran

Pengamatan dilakukan setelah 1x24 jam masa inkubasi. Daerah bening merupakan petunjuk kepekaan bakteri terhadap sampel yang diujikan. Aktivitas antibakteri dinyatakan dengan mengukur lebar diameter zona hambat menggunakan jangka sorong (Afni *et al*, 2015).

Analisis Data

Data hasil evaluasi organoleptis dan homogenitas dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dianalisis secara statistik dan disajikan dalam bentuk tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Fisikokimia Masker *peel-off* Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum sanctum*)

Hasil pemeriksaan organoleptis masker *peel-off* ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum*) berwarna hijau kecoklatan, berbau khas daun kemangi, dan memiliki tekstur yang kental. Warna sediaan dipengaruhi oleh warna ekstrak daun kemangi, sesuai yang terlihat pada Gambar 1. Secara visual, ketiga formula dapat dikatakan homogen karena tidak adanya butiran kasar pada uji homogenitas. Hasil pengukuran pH, viskositas, daya sebar dan waktu mengering, ditunjukkan pada Tabel II.



Gambar 1. Sediaan Masker *Peel-off* Ekstrak Daun Kemangi (a) Formula 1; (b) Formula 2; dan (c) Formula 3

Tabel II. Hasil Karakteristik Fisikokimia Sediaan Masker *Peel-off* Ekstrak Daun Kemangi

Formula	pH	Viskositas (cps)	Daya Sebar (cm)	Waktu Mengering (menit)
1	5,84±0,01	3150±304,14	3,95±0,48	33,97±1,54
2	5,93±0,04	3816,67±175,59	3,72±0,14	36,63±3,48
3	5,88±0,01	3400±360,55	3,49±0,34	43,67±2,97

Penggunaan konsentrasi ekstrak yang berbeda pada sediaan (6%, 8%, dan 10%) menghasilkan karakteristik yang berbeda pula. Seperti yang terlihat pada Tabel II, nilai pH sediaan cenderung asam. Hal ini disebabkan karena ekstrak daun kemangi memiliki sifat asam. Namun, nilai pH tersebut, masih dalam rentang normal pH kulit yaitu antara 4,5-6,5 (Al Muazham and Husnani, 2017). Hasil viskositas cenderung meningkat dengan adanya penambahan ekstrak. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh penambahan ekstrak kental sehingga meningkatkan nilai viskositas sediaan. Hasil uji daya sebar sejalan dengan teori bahwa nilai viskositas berbanding terbalik dengan daya sebar sediaan. Semakin besar nilai viskositas maka semakin kecil kemampuan suatu sediaan untuk menyebar (Deuschle et al., 2015). Penurunan daya sebar ini dapat disebabkan oleh meningkatnya unit partikel dari bahan aktif karena telah mengabsorbsi pelarut sehingga cairan tahan dan meningkatkan tekanan (Sulastri and Chaerunisa, 2018). Selanjutnya, pengujian waktu mengering dilakukan untuk melihat waktu yang dibutuhkan sediaan untuk membentuk lapisan pada kulit dan mengering. Berdasarkan Tabel II terlihat bahwa semakin banyak tambahan ekstrak, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan sedang untuk mengering. Hal ini dapat terjadi karena mekanisme kerja PVA yang mengembang dengan cara mengikat air yang ada dalam sediaan, kemudian menyebabkan terjadinya proses tarik-menarik antar molekul air, yang menyebabkan peningkatan kohesivitas. Seiring semakin banyak ekstrak yang ditambahkan, semakin lama proses pengikatan air yang dilakukan oleh PVA (Warnida et al., 2016). Hasil tersebut belum memenuhi persyaratan untuk waktu mengering masker *peel-off* yang baik, yaitu 15-30 menit (Ariani and Wigati, 2016). Hal ini dapat dipengaruhi oleh konsentrasi PVA yang digunakan, dimana semakin besar konsentrasi PVA maka semakin cepat waktu mengering sediaan (Warnida et al., 2016).

21

Aktivitas Antibakteri Masker *Peel-off* Ekstrak Daun Kemangi

Aktivitas antibakteri sediaan masker *peel-off* ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum* L.) ditentukan melalui pengamatan diameter zona hambat. Pengamatan dilakukan setelah masa inkubasi 24 jam, dengan 3 kali replikasi untuk masing-masing sediaan masker *peel-off*. Hasil pengukuran zona hambat ditunjukkan pada Tabel III.

Tabel III. Diameter Zona Hambat Sediaan Masker *Peel-off* Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum sanctum* L)

Bakteri Uji	Formula	Diameter Zona Hambat (mm)
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	9,97±0,41
	2	11,02 ± 0,16
	3	11,62 ± 0,27
	K+	37,29 ± 6,55
	K-	0
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1	16,04 ± 2,65
	2	18,69 ± 1,31
	3	21,21 ± 1,72
	K+	32,61 ± 1,23
	K-	0
<i>Propionibacterium acnes</i>	1	16,97 ± 2,07
	2	20,63 ± 2,28
	3	23,13 ± 1,82
	K+	28,89 ± 0,70
	K-	0

Berdasarkan Tabel III dapat dilihat bahwa sediaan masker *peel-off* ekstrak daun kemangi menunjukkan adanya diameter zona hambat terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Propionibacterium acne*. Diameter zona hambat meningkat secara signifikan seiring dengan adanya penambahan bahan aktif. Hal tersebut diakibatkan adanya aktivitas antibakteri yang dihasilkan oleh kandungan senyawa senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak daun kemangi yaitu tanin, flavonoid, dan minyak atsiri. Kandungan tanin mampu membentuk kompleks protein melalui ikatan hidrogen sehingga protein akan terdenaturasi dan mengganggu metabolisme bakteri. Selain tanin, kandungan senyawa flavonoid yang bersifat lipofilik akan merusak membran fosfolipid bakteri sehingga mampu mengurangi permeabilitas dan merusak membran sel bakteri serta keluarnya senyawa intraseluler. Kandungan minyak atsiri dalam ekstrak kemangi juga memiliki daya antibakteri yang kuat sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan baik (Angelina *et al*, 2015). Berdasarkan kategori kelompok antibakteri berdasarkan diameter zona hambatnya, sediaan tersebut termasuk kategori kuat untuk bakteri *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus epidermidis* serta kategori sedang untuk bakteri *Staphylococcus aureus* (Lingga *et al*, 2015). Hal tersebut mengindikasikan adanya potensi dari sediaan masker *peel-off* ekstrak daun kemangi ini untuk digunakan sebagai terapi pengobatan jerawat.

KESIMPULAN

Sediaan masker *peel-off* ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum*) dengan variasi kadar 6%, 8%, dan 10% memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Propionibacterium acne*, *Staphylococcus aureus*, dan *Staphylococcus epidermidis*. Sehingga sediaan ini berpotensi sebagai alternatif pada terapi pengobatan jerawat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N., Said, N., Yuliet, 2015. Uji Aktivitas Antibakteri Pasta Gigi Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L.) TERHADAP Streptococcus mutans DAN Staphylococcus aureus. *J. Pharm.* 1, 48–58.
- Ali, H., Dixit, S., 2012. In vitro antimicrobial activity of flavanoids of *Ocimum sanctum* with synergistic effect of their combined form. *Asian Pacific J. Trop. Dis.* 2. [https://doi.org/10.1016/S2222-1808\(12\)60189-3](https://doi.org/10.1016/S2222-1808(12)60189-3)
- Andini, T., Yusriadi, Y., Yuliet, Y., 2017. Optimasi Pembentuk Film Polivinil Alkohol dan Humektan Propilen Glikol pada Formula Masker Gel Peel off Sari Buah Labu Kuning (*Cucurbita moschata Duchesne*) sebagai Antioksidan. *J. Farm. Galen. (Galenika J. Pharmacy)* 3, 165–173. <https://doi.org/10.22487/j24428744.0.v0.i0.8773>
- Angelina, M., Turnip, M., Khotimah, S., 2015. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum sanctum* L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *J. Protobiont* 4, 184–189.
- Ariani, Li.W., Wigati, D., 2016. Formulasi Masker Gel Peel-Off Ekstrak Etanol Kulit Buah Jeruk MAnis (*Citrus sinensis* (L.) Osbeck) sebagai Obat Jerawat. Media Farm. Indones. 11, 1084–1092.
- Arinjani, S., Ariani, L.W., 2020. Pengaruh Variasi Konsentrasi PVA pada Karakteristik Fisik Sediaan Masker Gel Peel-off Ekstrak Daun Ungu (*Graptophyllum pictum* L. Griff.). Media Farm. Indones. 14, 1525–1530.
- Asthana, N., Pal, K., Aljabali, A.A.A., Tambuwala, M.M., de Souza, F.G., Pandey, K., 2021. Polyvinyl alcohol (PVA) mixed green-clay and aloe vera based polymeric membrane optimization: Peel-off mask formulation for skin care cosmeceuticals in green nanotechnology. *J. Mol. Struct.* 1229, 129592. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.129592>
- Deuschle, V.C.K.N., Deuschle, R.A.N., Bortoluzzi, M.R., Athayde, M.L., 2015. Physical chemistry evaluation of stability, spreadability, in vitro antioxidant, and photo-protective capacities of topical formulations containing *calendula officinalis* L. Leaf extract. *Brazilian J. Pharm. Sci.* 51, 63–75. <https://doi.org/10.1590/S1984-822X2015000100005>

- 82502015000100007
- Firdaus Al Muazham, M., Husnani, 2017. Optimasi Parameter Fisik Viskositas, Daya Sebar Dan Daya Lekat Pada Basis Natrium Cmc Dan Carbopol 940 Pada Gel Madu Dengan Metode Simplex Lattice Design. *J. Ilmu Farm. dan Farm. Klin.* 14, 11–18.
- Kindangen, O.C., Yamlean, P.V.Y., Wewengkang, D.S., 2018. Formulasi Gel Antijerawat Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum basilicum* L.) Dan Uji Aktivitasnya Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *in vitro*. *Pharmacon* 7, 283–293. <https://doi.org/10.35799/pha.7.2018.20505>
- Lingga, A.R., Pato, U., Rossi, E., 2015. Antibacterial Test Of Kecombrang (*Nicolaia Speciosa* Horan) Stem Extract Againts *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. *JOM Faperta* 2.
- Rompis, F., Yamlean, P.V.Y., Lolo, W.A., 2019. Formulasi Dan Uji Efektivitas Antioksidan Sediaan Masker Peel-Off Ekstrak Etanol Daun Sesewanua (*Cleodendron squamatum* Vahl.). *Pharmacon* 8, 388. <https://doi.org/10.35799/pha.8.2019.29305>
- Saptarini, N.M., Hadisoebroto, G., 2020. Formulation and evaluation of lotion and cream of nanosized chitosan-mangosteen (*Garcinia mangostana* L.) pericarp extract. *Rasayan J. Chem.* 13, 789–795. <https://doi.org/10.31788/RJC.2020.1325533>
- Septianindri kurnia, V., 2015. Pengaruh Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum americanum* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Propionibacterium acne* Dan Pemanfaatannya Sebagai Buku Non-Teks 27.
- Sulastri, A., Chaerunisaa, A.Y., 2018. Formulasi Masker Gel Peel Off untuk Perawatan Kulit Wajah. *Farmaka* 14, 17–26.
- Sutanto, R.S., 2013. Derajat Penyakit Acne Vulgaris Berhubungan Positif Dengan Kadar MDA. Tesis.
- Tambajong, J., Naharia, O., Rompas, H.D., 2017. Pengaruh Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum sanctum* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus epidermidis*. *J. Sains, Mat. dan Edukasi Jur. Biol.* FMIPA UNIMA 5, 105–110.
- Walsh, T.R., Efthimiou, J., Dréno, B., 2016. Systematic review of antibiotic resistance in acne: An increasing topical and oral threat. *Lancet Infect. Dis.* 16, e23–e33. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(15\)00527-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(15)00527-7)
- Warnida, H., Oktaviani, R., Sukawaty, Y., 2016. Formulasi Masker Gel Peel-Off Ekstrak Etanol Umbi Bawang Dayak (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb.) Husnul. *Media Sains* 9, 167–173.

FORMULASI MASKER PEEL-OFF EKSTRAK DAUN KEMANGI (*Ocimum sanctum*) SEBAGAI SEDIAAN ANTI JERAWAT

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | jkk.unjani.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 2 | Submitted to Universitas Pendidikan
Indonesia
Student Paper | 1 % |
| 3 | Submitted to Sriwijaya University
Student Paper | 1 % |
| 4 | journal.unimma.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | Adel Fina Oktaviani, St. Rahmatullah, Dwi
Bagus Pambudi. "Formulasi Sediaan Obat
Kumur Ekstrak Etanol Daun Selasih (<i>Ocimum
Basilicum L.</i>) Sebagai Uji Aktivitas Antibakteri
<i>Streptococcus Mutans</i> ", Jurnal Ilmiah JOPHUS
: Journal Of Pharmacy UMUS, 2021
Publication | 1 % |
| 6 | Masusil Hidayati. "IDENTIFIKASI SENYAWA
ANTOSIANIN EKTRAK DAUN KELOR (<i>Moringa
oleifera L.</i>) DAN AKTIVITASTERHADAP BAKTERI | 1 % |

Staphylococcus aureus.", Jurnal Mahasiswa Kesehatan, 2021

Publication

-
- 7 Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta

Student Paper

1 %

- 8 journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

1 %

- 9 text-id.123dok.com

Internet Source

1 %

- 10 ojs.poltekkes-medan.ac.id

Internet Source

1 %

- 11 repository.unugiri.ac.id

Internet Source

1 %

- 12 docplayer.info

Internet Source

1 %

- 13 journal.ubaya.ac.id

Internet Source

1 %

- 14 karyailmiah.unisba.ac.id

Internet Source

1 %

- 15 Rifo Alif Yunio. "Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kenikir (*cosmos caudatus* k.) terhadap Bakteri *Propionibacterium Acnes*", FASKES : Jurnal Farmasi, Kesehatan, dan Sains, 2023

Publication

1 %

16	ejournal.poltektegal.ac.id Internet Source	1 %
17	es.scribd.com Internet Source	1 %
18	journal.poltekkes-mks.ac.id Internet Source	1 %
19	majalah.farmasetika.com Internet Source	1 %
20	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
21	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
22	123dok.com Internet Source	1 %
23	Eny Nurhikma, Randa Wulaisfan, Musdalipah Musdalipah, Yulianti Fauziah, Nirwati Rusli. "FORMULASI SEDIAAN MASKER GEL PEEL OFF EKSTRAK DAUN WALAY (MEISTERA CHINENSIS) ASAL SULAWESI TENGGARA", Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, 2023 Publication	1 %
24	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1 %

25	ejournal.unima.ac.id Internet Source	1 %
26	ejurnal.setiabudi.ac.id Internet Source	1 %
27	pt.scribd.com Internet Source	1 %
28	ojs.unanda.ac.id Internet Source	1 %
29	www.stfm.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%